Ambiente | IDEAM

BO
LE
TÍN
46

Primer trimestre
Enero - marzo de 2026

Boletín de Detección Temprana de Deforestación (DTD)

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)

Con el apoyo técnico de:
CORPOAMAZONIA Ambiente para la paz
CDA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico
Cormacarena Somos vida, somos Meta

Financiado por:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GREEN CLIMATE FUND
PROGRAMA REM Visión Amazonía REDD EARLY MOVERS
Corazón de la Amazonia
Fondo para la Vida y la Biodiversidad

Presidencia de la República de Colombia

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
Presidente de la República de Colombia

FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA
Vicepresidenta de Colombia

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

IRENE VÉLEZ TORRES
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e)

EDITH BASTIDAS CALDERÓN
Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental

LUZ DARY CARMONA MORENO
Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio (e)

Consejo Directivo

LUZ DARY CARMONA MORENO
Viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio (e)

PAOLA RICAURTE AYALA
Asesora de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Departamento Nacional de Planeación (DNP)

ELKIN ERNESTO RAMÍREZ NIÑO
Director técnico de la Dirección Técnica Geoestadística - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

GIOVANNYS MEDRANO MARTÍNEZ
Director general - Corporación para el Desarrollo Sostenible de La Mojana y el San Jorge (Corpomojana)

LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
Viceministra de Infraestructura (representación de la ministra de Transporte)

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)

GHISLIANE ECHEVERRY PRIETO
Directora general

JUAN FERNANDO ACOSTA MIRKOW
Secretario general

FABIO ANDRÉS BERNAL QUIROGA
Subdirector de Hidrología

ELIZABETH PATIÑO CORREA
Subdirectora de Estudios Ambientales

JULIO CÉSAR LEÓN LUQUEZ
Subdirector de Ecosistemas e Información Ambiental (e)

DIANA CAROLINA RUEDA DIMATE
Subdirectora de Meteorología

JENNIFER DORADO DELGADO
Jefa de Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas

OLGA MARCELA VARGAS VALENZUELA
Jefe de Oficina Asesora de Planeación

WÍLMER ESPITIA MUÑOZ
Jefe de la Oficina de Informática

GILBERTO ANTONIO RAMOS SUÁREZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

ADRIANA MARÍA OCAMPO LOAIZA
Jefe de la Oficina de Control Interno

MIGUEL ÁNGEL AYALA TOVAR
Coordinador del Grupo de Comunicaciones y Prensa

Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental - Ideam

JULIO CÉSAR LEÓN LUQUEZ
Subdirector

LUIS MARIO MORENO AMADO
Coordinador del Grupo de Bosques

Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono (SMByC) - Ideam

EDERSSON CABRERA MONTENEGRO
Coordinador del SMByC

Componente de Procesamiento Digital de Imágenes de Satélite (PDI) del SMByC

GUSTAVO GALINDO
Líder del Componente de PDI

CRISTHIAN FORERO
Programa de Capacitación

OMAR SOTELO
Intérprete

LUIS GUERRERO
Intérprete

ANDRÉS ZULUAGA
Intérprete

FELIPE ESPEJO
Intérprete

NICOLÁS SÁENZ
Intérprete

FERNEY GUTIÉRREZ
Intérprete

CARLOS RAMOS
Intérprete

JOHAN RAMÍREZ
Intérprete

SANTIAGO PALACIOS
Intérprete

MÓNICA RIVERA
Intérprete

PATRICIA BOTINA
Intérprete

CAROL FRANCO
Estructuración de información

Equipo de Causas y Agentes de la Transformación del Bosque (CyA) del SMByC

JOSÉ JULIÁN GONZÁLEZ ARENAS
Líder del Equipo de CyA

ALEXÁNDER CUBILLOS GONZÁLEZ
Analista temático

CLAUDIA ALEJANDRA DUQUE QUEVEDO
Analista SIG

AMALIA GARAVITO GUERRERO
Analista de modelación

NIDIA VANEGAS PÉREZ
Profesional de Monitoreo Comunitario Participativo (MCP)

IVÁN PÉREZ VIZCAÍNO
Analista de modelación


JOSÉ LEONARDO LURDUY
Profesional estadístico

Equipo editorial

Coordinación editorial
ANDRÉS FELIPE TAPIERO RÍOS
Grupo de Comunicaciones y Prensa - Ideam

Corrección de estilo
LINA MARÍA DUARTE TOVAR
Grupo de Comunicaciones y Prensa - Ideam

Diseño editorial y diagramación
ALEJANDRO SEPÚLVEDA GAUER
Grupo de Comunicaciones y Prensa - Ideam



Martín pescador
Chloroceryle americana

Cítese como: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).(2026). *Boletín de Detección Temprana de Deforestación (DTD) N.° 46*. Ideam.

ISSN: 3115-0381 (En línea).

Publicación aprobada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam.
Junio de 2026. Bogotá, D. C., Colombia.
Distribución gratuita.

© Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam.
Calle 25 D n.°. 96 B - 70 - Bogotá, D. C.
PBX: +57 (601) 352 7160
contacto@ideam.gov.co

Contenido

Haga clic en cada sección

1

Pág. 5

¿QUÉ ES EL BOLETÍN DE DTD?

2

Pág. 9

NÚCLEOS ACTIVOS DE DEFORESTACIÓN

- Núcleo 1
- Núcleo 2
- Núcleo 3
- Núcleo 4
- Núcleo 5
- Núcleo 6
- Núcleo 7
- Núcleo 8
- Núcleo 9
- Núcleo 10
- Núcleo 11
- Núcleo 12
- Núcleo 13
- Núcleo 14
- Núcleo 15
- Núcleo 16
- Núcleo 17
- Núcleo 18
- Otras áreas de interés

3

Pág. 29

REPORTES ESTADÍSTICOS A NIVEL NACIONAL - DTD

- Municipios
- Departamentos
- Autoridades ambientales
- Parques Nacionales Naturales
- Regiones Naturales

4

Pág. 34

REPORTE REGIONAL DE DEFORESTACIÓN ESTIMADA PARA LA AMAZONÍA (ha)

- Principales resultados
- Distribución del tamaño de los parches deforestados
- Resultados del monitoreo regional

1.

¿QUÉ ES EL BOLETÍN DE DTD?

Menú

El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC), creado en 2012 y formalizado mediante el Decreto 1655 de 2017, es hoy una herramienta científica y estratégica para comprender las dinámicas de los bosques en Colombia. Sus datos oficiales permiten monitorear los cambios y tendencias, apoyar la conservación, priorizar acciones de control y promover el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de ellos.

Además de proveer información científica de valor sobre los bosques, el SMByC se caracteriza por ser un aliado estratégico para diferentes actores que trabajan por mitigar la deforestación en el país, como el Programa REM Colombia-Visión Amazonía (fase II), la iniciativa GEF-Corazón de la Amazonía, el Proyecto REDD+ de GCF-Visión Amazonía, y el Convenio 010 Ideam-FPVB, con cargo a recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Asimismo, trabaja en alianza con organizaciones sociales, productores y autoridades indígenas, a través de la Red Monitoreo Comunitario Participativo establecida desde 2015.

En este contexto, cada tres meses, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a través del SMByC, publica los boletines de Detección Temprana de Deforestación (DTD), los cuales incorporan estimaciones mensuales preliminares de pérdida de cobertura de bosque natural. Estos cálculos se basan en el procesamiento digital de imágenes satelitales, y permiten identificar las zonas del país, especialmente en la Amazonía colombiana, donde se concentra la deforestación (en este caso, durante abril, mayo y junio del año calendario). Los boletines de DTD constituyen una herramienta clave para el seguimiento de la implementación del Plan de Contención de la Deforestación y para orientar acciones institucionales, comunitarias y territoriales.

A partir de metodologías validadas y análisis geoespacial, estos boletines generan mapas e indicadores que muestran tendencias de pérdida de bosque a nivel nacional, regional y por núcleos críticos. Además, evidencian las causas y agentes asociados, como la praderización para acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agropecuaria por ganadería extensiva, entre otras, incluyendo eventos naturales. Para ello, el SMByC aplica una definición técnica tanto para bosque natural como para deforestación. Se considera bosque natural toda extensión de tierra de al menos 1 hectárea, ocupada principalmente por árboles, con una cobertura de copas mínima del 30 % y una altura del dosel igual o superior a 5 metros. Esta definición incluye arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, pero excluye coberturas arbóreas no naturales, como plantaciones forestales comerciales y cultivos agrícolas. Por su parte, la deforestación se define como la conversión, directa o inducida, del bosque a otro tipo de cobertura en un periodo determinado.

Desde su implementación, estos reportes se han generado por el SMByC de forma ininterrumpida y están disponibles en el portal del Ideam:

https://ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bosques

Ver infografía resumen del Boletín DTD 46

https://ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/Bosques

1.

¿QUÉ ES EL BOLETÍN DE DTD?

Menú

¿Cómo se generan las cifras de monitoreo del bosque?

1. **Definir qué es bosque:** el bosque natural se define como superficies de tierra de al menos 1 hectárea, dominadas por árboles que superan los 5 metros de altura y una cobertura mínima de dosel del 30 %. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma y árboles sembrados para la producción agropecuaria.
2. **Utilizar imágenes satelitales:** se utilizan imágenes satelitales de media resolución espacial, como las obtenidas por los programas satelitales Landsat (NASA) y Sentinel (ESA), que permiten observar cambios en las coberturas vegetales del planeta. Adicionalmente, se utilizan las imágenes satelitales de alta resolución de Planet.
3. **Procesar las imágenes:** implica todo el proceso de preparar las imágenes capturadas por los satélites para mejorar su calidad y optimizar la extracción de información. Principalmente se reducen las interferencias asociadas a nubes y sombras.
4. **Comparar periodos consecutivos:** se analizan dos periodos consecutivos (trimestres) para identificar las pérdidas en la superficie de bosque.
5. **Detectar cambios:** se identifican a nivel nacional las detecciones tempranas de deforestación mayores a 0,5 hectáreas, y se representan mediante puntos asociados a la coordenada del centro del parche deforestado. Para la Amazonía colombiana, se detectan los cambios cada mes y a nivel de polígono deforestado (Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo), o trimestral (Amazonas, Guainía y Vaupés), que se consolidan para reportar la deforestación estimada de esta región.
6. **Validar en campo:** en algunos casos, estos análisis se complementan con verificaciones en conjunto con autoridades ambientales (Corporaciones Ambientales Regionales [CAR] y Parques Nacionales Naturales [PNN]) para validar los hallazgos satelitales.
7. **Analizar causas y agentes:** se estudia qué actividades humanas o eventos naturales causaron la deforestación, y quiénes las ejecutan.
8. **Publicar y compartir resultados:** la información se difunde en el Boletín de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD) junto con los archivos geográficos de los puntos de las detecciones tempranas de deforestación y los núcleos identificados.

¿Quiénes participan en su elaboración?

Este reporte fue generado por un equipo técnico con roles de interpretación, coordinación y control de calidad, integrado por 14 hombres y 7 mujeres:



67 %
Hombres



33 %
Mujeres

Es importante aclarar que el Ideam genera información oficial a nivel nacional y departamental, y para las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). En este sentido, y debido a la escala cartográfica de análisis (1:100.000) y a consideraciones metodológicas, no se producen reportes oficiales a nivel veredal o para áreas de menor extensión, ya que estas no pueden ser mapeadas con el mismo nivel de precisión ni ser comparadas con las cifras consolidadas a nivel nacional. Se recomienda adelantar ejercicios territoriales para validaciones en escalas detalladas. La temporalidad de la información contenida en este boletín corresponde al trimestre analizado.

1.

¿QUÉ ES EL BOLETÍN DE DTD?

Menú

¿Qué son las causas y agentes?

Las causas directas de la deforestación son las actividades que originan la pérdida de cobertura de bosque, como la praderización para el acaparamiento de tierras, las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción de madera, la extracción ilícita de minerales, la expansión agrícola y los factores biofísicos.

Los agentes son actores sociales o económicos que, motivados por diferentes factores (causas subyacentes), toman la decisión de deforestar. Entender esta relación permite orientar estrategias de control y gestión sostenible del bosque, así como diseñar intervenciones efectivas desde lo local y lo institucional.

¿Cómo se genera la información sobre las causas y agentes de la deforestación para cada núcleo?

La caracterización de causas y agentes de la deforestación incluida en este boletín se elabora a partir del análisis de información proveniente de dos tipos de fuentes: i) insumos generados o gestionados directamente por el SMByC del Ideam, y ii) fuentes complementarias producidas por otras entidades o proyectos. En relación con estas últimas, su precisión es responsabilidad de la entidad o proyecto que las genera y publica, y, en este sentido, su utilización por parte del Ideam constituye un insumo complementario para el análisis técnico realizado en los núcleos trimestrales de detección temprana de deforestación (DTD).

Caracterización de las causas y agentes


La descripción de causas y agentes para los núcleos de detección temprana de deforestación corresponde a un ejercicio de caracterización técnica desarrollado conforme a los lineamientos conceptuales y metodológicos del SMByC del Ideam. Para su construcción, se toma como base la localización de las detecciones tempranas y la identificación de los núcleos donde estas se concentran en cada trimestre. Esta información se complementa con formularios remitidos a autoridades ambientales regionales, bases de datos del SMByC, análisis de imágenes satelitales, análisis espaciales y otras fuentes secundarias disponibles; posteriormente, estos insumos son integrados y triangulados para generar la caracterización general y el listado de principales causas directas identificadas en cada núcleo.

Para ampliar esta información, lo invitamos a consultar la publicación *Lineamientos conceptuales y metodológicos para la caracterización de causas y agentes de la deforestación en Colombia*.



¡Consulte la versión resumida!

Menú



Haga clic en la imagen para visitar el Boletín DTD 46 online


2 .

NÚCLEOS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE DEFORESTACIÓN

El primer boletín trimestral del año 2026 corresponde al pico y a la finalización de la temporada seca en las principales áreas forestales del país. Para este trimestre se identifican dieciocho (18) núcleos de detección temprana de deforestación, ubicados principalmente en el bioma de la Amazonía colombiana. Asimismo, el análisis indica que la mayor detección de núcleos de detección temprana por deforestación se asocia con los departamentos de Guaviare y Meta.

Núcleos

1 Cuemaní - San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá (Caquetá)	10 El Camuya (Caquetá)
2 Yaguará II (Meta-Guaviare)	11 Medio San Juan, Condoto (Chocó)
3 PNN Tinigua -La Macarena (Meta)	12 Villa Catalina - Puerto Guzmán (Putumayo)
4 La Uribe (Meta)	13 Río Sunsiyas-Caño Sucio, Cartagena del Chairá (Caquetá)
5 Kuway-Nueva York, El Retorno, Miraflores (Guaviare)	14 Acandí (Chocó)
6 Agua Bonita - Calamar (Guaviare)	15 Nueva Ilusión - Cartagena del Chairá (Caquetá)
7 Puerto Rico (Meta)	16 Mecaya - Puerto Leguízamo (Putumayo)
8 Mapiripán (Meta)	17 Río Caguán - Palermito (Caquetá)
9 Solano (Caquetá)	18 Montecristo (Bolívar)



Menú


NÚCLEO 1

Cuemaní - San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá Caquetá

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?



Durante el primer trimestre de 2026, el principal núcleo de presión por deforestación se localizó en el departamento del Caquetá, donde persiste y presenta un incremento de su extensión en la jurisdicción de los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Este núcleo extenso (130 km²) se consolida como el de mayor concentración de detecciones tempranas y de estimación de deforestación en el país, en comparación con lo identificado durante el año 2025.

Las detecciones tempranas de pérdida de cobertura boscosa se concentran de manera crítica en las márgenes sur y suroriental del río Yarí y en las inmediaciones del río Cuemaní. Espacialmente estas alertas se ubican en zonas de amortiguación y al interior del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete en su parte suroriental.

A nivel territorial, la afectación por deforestación impacta en el municipio de Cartagena del Chairá, en las veredas Nueva Colombia, Cerritos, Ilusiones del Yarí, Las Diosas, Caño Azul y en la zona de reserva forestal declarada por la Ley 2 de 1959. Asimismo, otras veredas afectadas son Flandes, El Venado, Laguna Verde, El Café, Los Ángeles, El Peneya, Primavera Bajo Caguán, El Jordán, Palmichales, Puerto Camelias, Remolinos del Caguán, El Convenio, Monserrate, El Caracol, Nueva Loma Larga, Las Claras, Jardín Camelias, Cuba, Puerto Nápoles, Caño Negro, Santa Elena, Santo Domingo, Sabaleta Alta y Caño Santo Domingo.

De igual manera, en el municipio de San Vicente del Caguán, se ven afectadas las veredas Ciudad Yarí, Diamante de la Riña, Lejanías 1, Lejanías 2, Barcelona, Alto Sardinata, Andakíes, Montecarlo Andaquíes, La Cabaña, La Sardinata Baja y Nuevo Horizonte.

* Nota: *esta zona de afectación se encuentra al interior de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) Yarí Jaguar, Caguán y Núcleo n.° 21.*

Causas directas

\+

Praderización para acaparamiento de tierras.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

\-

Infraestructura de transporte no planificada.

Continúa un proceso generalizado de deforestación a partir de lotes previamente transformados para la expansión de pastizales, con fines de acaparamiento de tierras y de prácticas ganaderas no sostenibles. Este proceso se centra en los accesos terrestres (trochas) que conectan los ríos Caguán y Yarí con el límite noroccidental del PNN Serranía de Chiribiquete.


NÚCLEO 2


Yaguara II
Meta y Guaviare

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?





Causas directas

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Infraestructura de transporte no planificada.

Este núcleo de alta deforestación, ubicado en la zona limítrofe de los departamentos del Meta y del Guaviare, persiste y aumenta su extensión. La dinámica de pérdida de cobertura boscosa muestra una expansión continua en los municipios de San José del Guaviare, Calamar y La Macarena. Las detecciones tempranas se registran en los bosques de las microcuencas situadas al sur del río Guayabero, en las inmediaciones del Caño San Antonio y al norte del río La Tunia. Esta dinámica de la deforestación se manifiesta con especial intensidad en el sector de Caño San Antonio y en la parte norte del resguardo indígena pijao, tucano y piratapuyo, Llanos del Yarí – Yaguara II. Asimismo, se reporta una fuerte afectación en las inmediaciones del sector norte del PNN Serranía de Chiribiquete, tanto al interior de esta área protegida como asociada a la construcción de infraestructura vial no planificada. Adicional a ello, las veredas más afectadas son Chuapal, El Capricho, San Miguel, Sardinata, Itilla y Bocas del Río Guayabero, La Cristalina, La Reforma, Los Pozos, Raudal y San Juan de Losada (La Macarena).

Nota: *esta zona de afectación se localiza al interior de la ZRC sector El Guayabero.*

La conversión del bosque natural a pastos para el acaparamiento de tierras y la expansión de prácticas ganaderas no sostenibles, a partir de áreas previamente deforestadas, continúa en este núcleo. La infraestructura de transporte no planificada, desde la vía marginal de la selva que se interna en el extremo noroccidental del PNN Serranía de Chiribiquete, hasta varias trochas en el límite norte del resguardo Llanos del Yarí-Yaguara II, dinamiza la transformación.


NÚCLEO 3


PNN Tinigua - La Macarena Meta

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?





Se identifica un núcleo con alta concentración de deforestación en el municipio de La Macarena (Meta), que afecta al PNN Tinigua, en el triángulo delimitado por el río Guayabero y las poblaciones de San Juan de Lozada y Bocas del Perdido. Esta presión afecta críticamente áreas de alta importancia ecológica y, principalmente, las alertas se concentran en el margen sur del río Guayabero, con la conversión del bosque en amplias extensiones de pastos.

Causas directas

\+

- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Praderización para acaparamiento de tierras.

\-

- Infraestructura de transporte no planificada.

La pérdida sistemática del bosque natural continúa en la zona centro-sur del PNN Tinigua, causada principalmente por la praderización a gran escala para la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras. Este proceso tiene como ejes de transformación las vías no planificadas que se internan en el área protegida y conectan con el río Guayabero.


NÚCLEO 4

La Uribe Meta

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?



Este núcleo, con alta concentración de deforestación desde octubre de 2025, persiste y mantiene una dinámica activa en el municipio de La Uribe (Meta). La problemática afecta directamente los bosques ubicados en el corredor entre los PNN Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sierra de La Macarena, lo que evidencia una presión sostenida sobre estas áreas protegidas.

Se registra, además, una importante concentración de alertas por detecciones en el sector suroriental, con afectaciones en las inmediaciones del resguardo indígena emberá-katío de La Julia. Las alertas por detecciones mantienen una intensidad crítica en las veredas La Primavera, Tierra Adentro 2, La Siria, Mansitas, El Placer, Buenos Aires, La Pista 2 y La Julia, así como reportes de menor magnitud en sectores estratégicos como Triunfo, Palestina y Ativa 2.

Desde el punto de vista hidrográfico, este núcleo está delimitado al oriente por los ríos Duda, Guayabero y La Reserva, evidenciándose impactos significativos en las zonas ribereñas de estos afluentes, asociados a procesos de pérdida de cobertura boscosa y de transformación del uso del suelo.

Causas directas

\+

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

Praderización para acaparamiento de tierras.

\-


Infraestructura de transporte no planificada.

En el núcleo continúa la deforestación a gran escala al norte del PNN Tinigua, la cual afecta el límite del área protegida. La expansión y mejoramiento de vías no planificadas, que se internan en el PNN dinamizan la transformación del bosque para la ampliación de prácticas de ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras.

NÚCLEO 5

Kuway- Nueva York, El Retorno, Miraflores Guaviare

¿Dónde se encuentra?



Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación en los municipios de Miraflores y El Retorno (Guaviare), asociado a la apertura de vías no planificadas que facilitan la expansión de la frontera agropecuaria. Este núcleo se localiza próximo al límite occidental de la Reserva Nacional Natural Nukak, lo que evidencia una presión directa sobre esta área de especial protección. Desde el componente hidrográfico, la deforestación se concentra en los sectores de Caño Grande y Caño Camello, con incidencia local en las veredas Agua Bonita (media y baja) en El Retorno y en La Unión en Miraflores.

*Nota: *las deforestaciones están en la ZRC Guardiana de Chiribiquete.*

Causas directas

\+

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Infraestructura de transporte no planificada.

\-

- Cultivos de uso ilícito.

Sobre la vía Calamar-Miraflores y las trochas que conectan con este eje de transformación, se continúa consolidando la expansión de lotes previamente deforestados para el acaparamiento de tierras y el establecimiento de prácticas no sostenibles de ganadería extensiva. En la zona noroccidental del núcleo persiste la expansión de algunas áreas destinadas a cultivos de uso ilícito.


NÚCLEO 6


Agua Bonita - Calamar Guaviare

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?





Se identifica un núcleo de detección temprana en el municipio de Calamar (Guaviare), cuya dinámica se asocia principalmente a procesos de expansión de la frontera agropecuaria. Esta transformación es facilitada por la apertura progresiva de vías no planificadas, que configuran corredores de acceso que avanzan en dirección nororiental hacia el PNN Serranía de Chiribiquete, generando una presión directa sobre la integridad ecológica de esta área protegida.

Desde el punto de vista espacial, el núcleo afecta la zona de reserva forestal declarada por la Ley 2 de 1959; no obstante, la mayor concentración de detecciones tempranas de deforestación se registra en las veredas Caño Gravilla, Puerto Palma, La Cristalina y El Triunfo, en jurisdicción del municipio de Calamar, donde se observan patrones de pérdida de cobertura boscosa altamente concentrados y en expansión.

*Nota: *las deforestaciones se ubican en la ZRC Guardiana de Chiribiquete.*

Causas directas

+

Praderización para acaparamiento de tierras.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

-


Infraestructura de transporte no planificada.


La continua expansión de los accesos terrestres informales (trochas) que parten del casco urbano del municipio de Calamar y se dirigen hacia el límite noroccidental del PNN Serranía de Chiribiquete dinamiza la ampliación de lotes previamente deforestados para el establecimiento de prácticas no sostenibles de ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras.

NÚCLEO 7

Puerto Rico Meta

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de detección temprana, ubicado principalmente en el municipio de Puerto Rico (Meta), con detecciones tempranas adicionales en el municipio de Vista Hermosa (Meta). La dinámica de pérdida de cobertura boscosa afecta directamente al sector oriental del PNN Sierra de La Macarena y sus zonas de amortiguación, lo que evidencia una alta concentración de alertas en esta área protegida.

Los eventos de deforestación se concentran en las microcuencas del río Cafre y del caño La Cabra. A nivel local, la afectación se concentra en la vereda La Cabaña del municipio de Puerto Rico, donde se observan parches grandes y concentrados de pérdida de cobertura boscosa.

*Nota: *esta zona de afectación se localiza al interior de la ZRC Puerto Rico (río Cafre).*

Causas directas

\+

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Cultivos de uso ilícito.

\-


- Infraestructura de transporte no planificada.


La ocupación y la transformación para el acaparamiento de tierras y para prácticas de ganadería extensiva no sostenibles, así como para el establecimiento de cultivos de uso ilícito, se siguen consolidando en el límite nororiental del PNN Sierra de La Macarena. La expansión de vías no planificadas (trochas) desde el río Ariari que se internan en el área protegida refuerza esta dinámica.

NÚCLEO 8

Mapiripán Meta

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación localizado en el sector nororiental del municipio de Mapiripán (Meta), en los bosques delimitados por los ríos Iteviare y Siare, donde la dinámica de pérdida de cobertura boscosa afecta ecosistemas de alta importancia ecológica a nivel regional.

La deforestación se concentra con mayor intensidad en las veredas Alto Siare y Unibrisas del Iteviare, así como en las inmediaciones de los caños El Mangón y Las Viejitas. Otros sectores de afectación se identifican en las veredas Brisas, Rincón del Indio y El Caribe, lo que refleja un patrón espacial de afectación disperso, con focos de mayor concentración en el Alto Siare.

Causas directas

\+

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Infraestructura de transporte no planificada.

\-


- Expansión agrícola de pequeña escala.


La praderización con fines de acaparamiento de tierras y prácticas no sostenibles de ganadería extensiva se amplía a partir de lotes ya deforestados, utilizando como ejes de transformación los accesos viales no planificados que se expanden por todo el núcleo. En comparación, los cultivos de pequeña escala tienen un menor impacto en el bosque.

NÚCLEO 9

Solano Caquetá

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación en los municipios de Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá). La dinámica de pérdida de cobertura boscosa se concentra geográficamente al norte del resguardo indígena koreguaje Jericó-Consaya, con afectaciones de alta intensidad en las márgenes del río Sunsiyas.

A nivel territorial, en el municipio de Solano, la afectación se focaliza en las veredas Caño Verde, Sábalo y Nueva Libertad, mientras que en el municipio de Cartagena del Chairá, las detecciones tempranas impactan en las veredas La Ceiba, Sunsiya Medio, Villa Nueva y Peñas Blancas. En conjunto, este núcleo evidencia una dinámica concentrada de deforestación asociada a los corredores fluviales y a la transformación progresiva de las coberturas boscosas en una zona clave para la estabilidad ecológica regional.

Causas directas

+

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Infraestructura de transporte no planificada.

-


- Extracción de madera (tala ilegal).


La expansión de la frontera agropecuaria para el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva constituye la principal causa de la deforestación en el núcleo. Este proceso se dinamiza con la expansión de la infraestructura de transporte asociada al río Sunsiya, que se convierte en el eje principal de la transformación. En comparación, la extracción ilegal de madera genera menores impactos en los bosques.

NÚCLEO 10

El Camuya Caquetá

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación localizado en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), que presenta una dinámica activa de pérdida de cobertura boscosa en las inmediaciones del sector noroccidental del PNN Serranía de Chiribiquete, en particular en la cuenca del río El Camuya.

Si bien la mayor presión de la deforestación se concentra fuera del área protegida, se evidencia la presencia de parches de deforestación de carácter disperso al interior del PNN. La afectación se concentra territorialmente, con mayor densidad en la vereda Altagracia, y registra incidencias significativas en las veredas El Camuya, Aguas Claras y Nueva Esperanza. Se destaca la presencia de parches de deforestación de carácter disperso al interior del PNN en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán.

Causas directas

\+

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

\-

- Infraestructura de transporte no planificada.

La deforestación en el núcleo se relaciona principalmente con la expansión de lotes previamente transformados, mediante el establecimiento de pastizales para el acaparamiento de tierras y con prácticas ganaderas no sostenibles. La expansión de la infraestructura de transporte no planificada, que comunica las sabanas del Yarí con el límite noroccidental del PNN Serranía de Chiribiquete, continúa dinamizando la transformación.


NÚCLEO 11


Medio San Juan, Condoto Chocó

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?





Este núcleo se localiza en los municipios de Medio San Juan (Andagoya), Condoto y Nóvita, en el departamento del Chocó. La deforestación en esta zona se debe principalmente a la alta actividad de minería de aluvión, con una pérdida de cobertura boscosa concentrada en las márgenes de los ríos Brazuelo y Aguasucia. Asimismo, se registran afectaciones en las inmediaciones del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Cocomocoiro en el municipio de Condoto.

Causas directas

\+ Extracción ilícita de minerales.


\- Cultivos de uso ilícito.

La principal causa de la deforestación se asocia con la masiva afectación causada por la extracción ilícita de minerales (oro de aluvión) en el curso del río San Juan y sus afluentes, en la cercanía al casco urbano del municipio de Nóvita (Chocó). En algunas zonas específicas del núcleo persisten áreas con cultivos de uso ilícito que pueden generar afectaciones puntuales a los bosques remanentes.

NÚCLEO 12

Villa Catalina - Puerto Guzmán Putumayo

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo), asociado al interfluvio de los ríos Sabilla y Yurilla, que se extiende hacia la quebrada Las Dantas. Esta dinámica evidencia la persistencia de la pérdida de cobertura boscosa en la zona central del núcleo, en concordancia con los patrones observados en los trimestres previos de 2025.

A nivel territorial, la mayor densidad de alertas tempranas se concentra en la vereda Yurilla y en el área forestal homónima, en jurisdicción del municipio de Puerto Guzmán. Esta dinámica impacta directamente en el resguardo indígena inga Villa Catalina de Puerto Rosario, particularmente en su sector nororiental, lo que evidencia presiones sobre los territorios étnicos y los ecosistemas estratégicos asociados.

Causas directas

+

- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Infraestructura de transporte no planificada.

-


- Cultivos de uso ilícito.


La ampliación de áreas previamente deforestadas para la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras se consolida como la principal causa de la pérdida del bosque en el núcleo. La infraestructura de transporte no planificada que comunica el río Caquetá con el resguardo Villa Catalina, en Puerto Rosario, dinamiza la transformación. Persisten algunas afectaciones al bosque por cultivos de coca en el noroccidente del núcleo.

NÚCLEO 13

Río Sunsiyas-Caño Sucio, Cartagena del Chairá Caquetá

¿Dónde se encuentra?





Causas directas

\+

Praderización para acaparamiento de tierras.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

\-

Infraestructura de transporte no planificada.

Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación localizado en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), que se conecta al suroriente con el núcleo de Cuemaní, lo que incrementa la criticidad de la dinámica de pérdida de cobertura boscosa en la región.

Espacialmente, las alertas tempranas de deforestación se concentran en las inmediaciones del PNN Serranía de Chiribiquete, generando una presión directa sobre las áreas adyacentes a esta área protegida de alta importancia ecológica. La deforestación se distribuye principalmente a lo largo del margen sur del río Sunsiyas y del río Caguán, incluida su zona de confluencia, lo que evidencia una fuerte relación con los corredores fluviales.


A nivel territorial, la afectación se concentra en las veredas Naranjales y Caño Sucio, en la jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá. Asimismo, el núcleo se ubica al norte del resguardo indígena huitoto Paraje de Witora, lo que evidencia presiones sobre los territorios étnicos y las áreas estratégicas para la conectividad ecológica regional.

Continúa la ampliación de las áreas de pastizales para el acaparamiento de tierras y la expansión de prácticas ganaderas no sostenibles, que son la principal causa de la deforestación en el núcleo. La expansión de la infraestructura de transporte (trochas que conectan con los ríos Sunsiyas y Caguán) impulsa la transformación del bosque.

NÚCLEO 14


Acandí Chocó

¿Dónde se encuentra?



Volver al mapa

Menú



Se identifica un núcleo de deforestación localizado en el municipio de Acandí (Chocó), en una zona de alta importancia ecológica. La dinámica de pérdida de cobertura boscosa se asocia principalmente a las márgenes del río Tolo.

Esta dinámica impacta directamente la Reserva Forestal Protectora Nacional del Darién y el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Playona y Loma de Caleta. Asimismo, se registran alertas por detecciones tempranas de deforestación en el resguardo indígena emberá katío de Pescadito, lo que evidencia presiones sobre los territorios étnicos y los ecosistemas estratégicos del Chocó biogeográfico.

\+ Factores biofísicos (remoción en masa).


\- Extracción ilícita de minerales.


Las detecciones de deforestación en el núcleo corresponden principalmente a fenómenos naturales de remoción de masa (deslizamientos de tierra) en zonas con pendientes medias y altas. Adicionalmente, es posible que las actividades incipientes de extracción ilícita de minerales en la zona hayan contribuido a este proceso al debilitar el suelo en las cercanías del río Tolo.

NÚCLEO 15

Nueva Ilusión - Cartagena del Chairá Caquetá

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo de deforestación en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá), ubicado hacia el suroccidente del núcleo de Cuemaní, lo que incrementa la criticidad de la dinámica de pérdida de cobertura boscosa en la región.

Desde el punto de vista hidrográfico, esta dinámica se delimita al oriente por el río Caguán y al sur por el río Sunsiyas, lo que evidencia una fuerte relación con los corredores fluviales. La deforestación se concentra con mayor intensidad en las veredas Nueva Ilusión y Laguna Verde, en jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, donde se observan patrones altamente concentrados de pérdida de cobertura boscosa.

Causas directas

\+

- Praderización para acaparamiento de tierras.
- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

\-


- Infraestructura de transporte no planificada.


Sobre los accesos viales (trochas) que conectan con los ríos Caguán y Sunsiyas, como principales ejes de la transformación del bosque, se consolida la expansión de pastizales para el acaparamiento de tierras y las prácticas ganaderas no sostenibles, generalmente en lotes contiguos a áreas previamente deforestadas.

NÚCLEO 16

Mecaya - Puerto Leguízamo Putumayo

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

Se identifica un núcleo persistente de deforestación localizado en el municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuya dinámica de pérdida de cobertura boscosa se observa en las inmediaciones del sector norte del PNN La Paya, lo que genera una alteración directa en las áreas adyacentes a esta área protegida.

Desde el punto de vista geográfico, la deforestación se asocia con los bosques en las inmediaciones del río Sencella. La mayor intensidad de afectación se concentra en las veredas Puerto Príncipe, Punto Rojo y Casa Roja, en jurisdicción del municipio de Puerto Leguízamo, donde se observan patrones de pérdida de cobertura boscosa de carácter concentrado.

Causas directas

\+

- Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.
- Praderización para acaparamiento de tierras.

\-


- Infraestructura de transporte no planificada.


La deforestación en el núcleo está principalmente asociada con la praderización para la expansión de prácticas no sostenibles de ganadería extensiva y con el acaparamiento de tierras en áreas contiguas a lotes ya deforestados. La incipiente expansión de accesos terrestres (trochas) que comunican con el río Sensella, entre el límite norte del PNN La Paya y el río Caquetá, refuerza la transformación del bosque remanente.

NÚCLEO 17

Río Caguán - Palermito Caquetá

¿Dónde se encuentra?





Volver al mapa

Menú

El núcleo de deforestación se localiza en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, con una consolidación hacia el sector centroccidental del municipio. La dinámica de pérdida de cobertura boscosa evidencia concentraciones de detecciones tempranas en la margen oriental del río Caguán, asociadas principalmente a la quebrada Palermito. Estas alertas reflejan procesos activos de transformación del bosque que impactan directamente en las veredas Los Lirios y Palermito.

Causas directas

+

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva.

Praderización para acaparamiento de tierras.

-

Infraestructura de transporte no planificada.

El núcleo corresponde a una zona con altos niveles de transformación del bosque, principalmente debido a la expansión de la frontera agropecuaria. La expansión de la infraestructura de transporte no planificada, asociada a la cuenca media del río Caguán, refuerza la expansión de áreas de pastizales para prácticas ganaderas extensivas y el acaparamiento de tierras.


NÚCLEO 18

Montecristo Bolívar

Volver al mapa

Menú

¿Dónde se encuentra?





Se identifica un núcleo de pérdida de cobertura boscosa en el sur del departamento de Bolívar, en jurisdicción del municipio de Montecristo. A diferencia de los otros núcleos, este no se debe a presiones antrópicas directas, sino que la alteración en esta zona responde principalmente a eventos hidrometeorológicos extremos. En particular, el incremento de los niveles de precipitación generó procesos de remoción de masa (deslizamientos), que derivaron en la degradación y pérdida de cobertura forestal.

Los reportes de afectación se concentran en la parte alta de la quebrada Montecristo y sus tributarios, las quebradas Santa Clara, La Reseva y San Mateo, lo que compromete el sector norte de la serranía de San Lucas. Esta situación compromete la integridad ecológica de un sistema de alta relevancia regional, tanto por su biodiversidad como por su papel en la regulación hídrica y en la conectividad de los paisajes forestales.

Causas directas

\+ Factores biofísicos (remoción en masa).


\- Cultivos de uso ilícito.

El núcleo se ubica en la zona norte de la serranía de San Lucas, caracterizada por presentar pendientes elevadas y por su vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos extremos, lo que favorece la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa (deslizamientos de tierra) y la consecuente pérdida de bosque. Otra causa recurrente, con posible incidencia en la deforestación de algunas áreas específicas del núcleo, es la expansión de los cultivos de coca.


OTRAS ÁREAS DE INTERÉS

Menú


En relación con el primer trimestre de 2026, se ha identificado un incremento generalizado y disperso de la deforestación en otros bosques naturales de Colombia: en la **serranía de San Lucas (Antioquia y el sur de Bolívar)**; así como en todo el complejo montañoso de la **Sierra Nevada de Santa Marta**, abarcando los departamentos de **Magdalena, La Guajira y Cesar**; también en la región del **Catatumbo** se observa un incremento de detecciones de deforestación en un patrón disperso. Por otro lado, se reporta la presencia de grandes áreas deforestadas, originadas por actividades mineras, al interior del **PNN Puré**, en el departamento del **Amazonas**, las cuales afectan bosques ribereños del **río Puré**. Finalmente, persiste un incremento concentrado de alertas por detecciones en los municipios de **Urrao y Frontino (Antioquia)** y de **Tierralta (Córdoba)**, lo que compromete directamente la integridad ecológica del **PNN Paramillo**.




Serranía de San Lucas




Sierra Nevada de Santa Marta




Catatumbo



Parque Nacional Natural Puré



Urrao y Frontino (Antioquia) y Tierralta (Córdoba)



Tierralta (Córdoba)

3. REPORTE ESTADÍSTICO
Municipios

¿Cómo se definieron los rangos por colores en la gráfica?

Los rangos representados en la gráfica se definieron mediante agrupamientos estadísticos; para este caso, fueron generados mediante el método de grupos naturales, también conocido como método de optimización de *Natural Breaks / Jenks*.

Número de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD):


Muy bajo | Medio-alto | Alto | Muy alto

Distribución de municipios con mayor cantidad de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD), primer trimestre de 2026

Menú

Municipio afectado






3. REPORTE ESTADÍSTICO
Departamentos

Menú

¿Cómo se definieron los rangos por colores en la gráfica?

Los rangos representados en la gráfica se definieron mediante agrupamientos estadísticos; para este caso, fueron generados mediante el método de grupos naturales, también conocido como método de optimización de *Natural Breaks / Jenks*.




3. REPORTE ESTADÍSTICO
Autoridades ambientales

Menú

¿Cómo se definieron los rangos por colores en la gráfica?

Los rangos representados en la gráfica se definieron mediante agrupamientos estadísticos; para este caso, fueron generados mediante el método de grupos naturales, también conocido como método de optimización de *Natural Breaks / Jenks*.




3. REPORTE ESTADÍSTICO
Parques Nacionales Naturales

Menú

¿Cómo se definieron los rangos por colores en la gráfica?


Los rangos representados en la gráfica se definieron mediante agrupamientos estadísticos; para este caso, fueron generados mediante el método de grupos naturales, también conocido como método de optimización de *Natural Breaks / Jenks*.




3. REPORTE ESTADÍSTICO

Regiones naturales

Menú





El mayor número de reportes está en:

- Parque Nacional Natural
  Tinigua
- Corporación Autónoma Regional
  Corpoamazonia
- Departamento
  Caquetá
- Municipio
  Cartagena del Chairá

4.

REPORTE REGIONAL DE DEFORESTACIÓN ESTIMADA PARA LA AMAZONÍA (ha)

Menú

PRINCIPALES RESULTADOS

Detecciones tempranas de deforestación


Deforestación en cifras para los departamentos de la región de la Amazonía colombiana (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo y Vaupés).

Categorización de capas

- Bosque estable
- No bosque estable
- Cuerpo de agua

Densidad de deforestación

- Baja
- Media
- Alta



Primer trimestre:
Enero - marzo de 2026

37.660

hectáreas reportadas en los departamentos de la Amazonía colombiana en el primer trismestre de 2026

10.608

hectáreas de aumento frente al mismo periodo de 2025


DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS PARCHES DEFORESTADOS

Menú

Para este periodo se reportaron 8.450 parches deforestados superiores a 1 hectárea en la Amazonía, de los cuales el 72 % corresponde a parches con áreas inferiores a 5 hectáreas, y el 17 %, a parches con áreas entre 5 y 10 hectáreas. Para este trimestre se identificaron 215 parches con áreas superiores a 20 hectáreas, que se concentran principalmente en el departamento de Guaviare, con 81 parches (38 %), en el Caquetá, con 63 parches (29 %), y en el Meta, con 62 parches (29 %).

Asimismo, se destaca que, para este primer trimestre de 2026, el mayor parche de pérdida de bosque de origen antrópico corresponde a un polígono de 90,7 hectáreas asociado a factores de praderización en la Zona de Baldíos de la Nación, en la vereda El Silencio, municipio de Mapiripán, Meta.

En términos de priorización de acciones, se identifican 70 parches de deforestación con áreas iguales o superiores a 30 hectáreas, de los cuales se destacan 9 parches con áreas superiores a 50 hectáreas, distribuidos en los departamentos de Meta (4 parches), Guaviare (3 parches) y Caquetá (2 parches).



6.125 polígonos inferiores a 5 hectáreas
1.439 polígonos entre 5 y 10 hectáreas
671 polígonos entre 10 y 20 hectáreas
184 polígonos entre 20 y 40 hectáreas
31 polígonos superiores a 40 hectáreas

Departamento con aumento de la deforestación estimada:

- **Caquetá:** 9.078 hectáreas deforestadas más que en el mismo trimestre de 2025.
- **Meta:** 3.151 hectáreas deforestadas más que en el mismo trimestre de 2025.
- **Guaviare:** 2.758 hectáreas deforestadas más que en el mismo trimestre de 2025.

Departamentos con disminución de la deforestación estimada:

- **Amazonas:** 305 hectáreas deforestadas menos que en el mismo trimestre de 2025.

RESULTADOS DEL MONITOREO REGIONAL


Menú

Primer trimestre de 2026, periodo enero-marzo

La deforestación estimada para este trimestre se concentró principalmente en los departamentos de Meta (32 %), Guaviare (30 %), Caquetá (30 %) y Putumayo (6 %).

Periodo	Autoridad ambiental regional	Departamento	Rango estimado de deforestación (ha)	% calidad general*
Enero	Cormacarena	Meta	4.748 – 5.143	97
	CDA	Guaviare	3.003 – 3.126	98
	Corpoamazonía	Caquetá	4.466 – 4.839	96
		Putumayo	1.054 – 1.165	96
Febrero	Cormacarena	Meta	6.049 – 6.424	95
	CDA	Guaviare	7.030 – 7.465	98
	Corpoamazonía	Caquetá	6.139 – 6.650	97
		Putumayo	1.148 – 1.219	96
Marzo	Cormacarena	Meta	1.006 – 1.069	97
	CDA	Guaviare	892 - 929	98
	Corpoamazonía	Caquetá	303 - 322	98
		Putumayo	146 - 159	95
Enero - Marzo	Corpoamazonía	Amazonas	106 - 123	93
	CDA	Guainía	147 - 172	94
		Vaupés	122 - 141	95

*Este es el porcentaje de exactitud y confiabilidad en la información del mapa por departamento y mes.



Te invitamos a conocer sobre la

ESPECIE DEL TRIMESTRE



CAIMO

Chrysophyllum januariense

Distribución:

Redescubierto recientemente en el departamento de Guainía, *Chrysophyllum januariense* es un árbol de la familia *Sapotaceae* que se consideraba extinto a nivel mundial desde 1998.

Su hallazgo fue confirmado por el Inventario Forestal Nacional liderado por el Ideam, lo que revela que la especie sobrevive en los bosques de la Amazonía colombiana.

Fuente:

Inventario Forestal Nacional (IFN) (2023).

Ambiente | IDEAM

BOLETÍN 46

Primer trimestre
Enero - marzo de 2026

Con el apoyo técnico de:

CORPOAMAZONIA Ambiente para la paz

CDA Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico

Cormacarena Somos vida, somos Meta

Financiado por:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GREEN CLIMATE FUND

PROGRAMA REM Visión Amazonía REDD EARLY MOVERS

Corazón de la Amazonia

Fondo para la Vida y la Biodiversidad