Boletín DTD 48

IDEAM

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental

Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD)
III trimestre (Julio - septiembre) 2026

Introducción

El **Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)** del **Ideam** continua con el proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas regionales, a través del cual se apoya la generación de los **Boletines trimestrales de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD)** que identifican los Núcleos de Alerta Temprana, y genera reportes mensuales de deforestación estimada para los departamentos de la Amazonia colombiana. Estos datos permiten identificar potenciales acciones territoriales para el control de la deforestación y la conservación del Bosque. Estas actividades se implementan gracias a recursos financieros de cooperación internacional provenientes del **Proyecto REDD+ de GCF-Visión Amazonía, el Programa REM Colombia-Visión Amazonía (fase II), la iniciativa GEF-Corazón de la Amazonia**, y el proyecto **Bosques para la vida** con cargo a recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

Durante el **tercer trimestre de 2026** se registra un **aumento en la incidencia de las detecciones tempranas de deforestación en el país**, en contraste con el segundo trimestre del año, periodo en el que no se consolidaron núcleos de alerta temprana. No obstante, este incremento no se expresa en grandes concentraciones, sino que se distribuye de manera dispersa en distintas regiones del territorio nacional. Este comportamiento es consistente con lo reportado para el tercer trimestre de 2025, cuando la temporada de lluvias coincidió con un aumento en la detección de alertas y de núcleos, así como con el incremento generalizado y disperso de la deforestación identificado durante el primer trimestre de 2026.



En este contexto, **se identifican cuatro (4) núcleos de Detección Temprana de Deforestación - DTD** en el bioma de la Amazonia: dos (2) en el departamento del **Caquetá**, en el municipio de San Vicente del Caguán y en inmediaciones del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete; uno (1) en el departamento del **Vaupés**, en el municipio de Taraira, en la frontera con Brasil, y uno (1) en el departamento del **Meta**, en el límite entre los municipios de Vista Hermosa y Puerto Lleras. Adicionalmente, se identifica un área de interés en el departamento del **Putumayo**, cuya dinámica se destaca por la dispersión y el volumen de sus detecciones.

Este reporte fue generado por un equipo técnico con roles de intérpretes, coordinación y control de calidad, integrado por 14 hombres y 7 mujeres.

70 % Hombres

30 % Mujeres

Halcón peregrino
Falco peregrinus

Con el apoyo técnico de:

Corporación Autónoma Regional para el Canal del Dique – CORMAGDALENA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – CDA
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Cormacarena

Financiado por:

REM Visión Amazonia
Corazón de la Amazonia
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GREEN CLIMATE FUND
Fondo para la Vida y la Biodiversidad

Núcleos de Detección Temprana de Deforestación - DTD

Núcleo 1 Cuemaní y Ciudad Yarí – San Vicente del Caguán – Caquetá

Durante el tercer trimestre de 2026, el principal núcleo de detecciones tempranas de deforestación se localiza en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en inmediaciones del sector oriental del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete. Desde el punto de vista hidrográfico, el núcleo se sitúa sobre la margen sur del río Yarí, aguas que en el río Cuemaní se ubica hacia el suroccidente. La mayor concentración de Detecciones Tempranas de Deforestación - DTD, se localizan en la márgen del caño Los Lobos, que forma parte de una microcuenca tributaria del río Yarí. A nivel territorial, la afectación se localiza en la confluencia del Núcleo veredal No. 21 y las veredas Ciudad Yarí y Nueva Esperanza en San Vicente del Caguán.

Causas de deforestación identificadas: Praderización acaparamiento de tierras; Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva; Infraestructura de transporte no planificada; Expansión agrícola en diferentes escalas

Núcleo 2 El Camuya – San Vicente del Caguán – Caquetá

Se identifica un núcleo de detecciones tempranas de deforestación en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en inmediaciones de los límites del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete. Este núcleo mantiene la dinámica de pérdida de cobertura boscosa reportada en la cuenca del río El Camuya durante el primer trimestre de 2026. Su cercanía al área protegida incrementa la presión sobre el borde noroccidental del PNN y afecta la continuidad de los bosques que lo conectan con su entorno. Las detecciones se concentran en las veredas Altagracia y El Camuya (San Vicente del Caguán). Esta dinámica responde a procesos de acaparamiento de tierras para el establecimiento de nuevas áreas de pastos. Esta zona de afectación se localiza en el sector nororiental de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) Yarí Jaguar, sobre su límite oriental.

Causas de deforestación identificadas: Praderización acaparamiento de tierras; Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva; Infraestructura de transporte no planificada

Núcleo 3 Río Taraira – Taraira – Vaupés

Se identifica un núcleo de detección temprana de deforestación en el municipio de Taraira (Vaupés), localizado principalmente sobre los afluentes de la margen occidental del río Taraira, en la zona de frontera entre Colombia y Brasil. Espacialmente, el núcleo se sitúa en inmediaciones del sector oriental del Parque Nacional Natural (PNN) Yaigojé Apaporis. A diferencia de los demás núcleos, la pérdida de cobertura boscosa en este sector no responde a presiones antrópicas directas, sino a un evento natural de chagras de viento. Aunque su origen es natural, el evento cobra relevancia por su localización en el entorno del PNN Yaigojé Apaporis.

Causas de deforestación identificadas: Factores biofísicos. Ráfagas descendentes de alta intensidad, asociadas a tormentas convectivas, que derriban de manera masiva los árboles del dosel y generan claros de gran tamaño.

Núcleo 4 Río Güéjar – Vista Hermosa y Puerto Lleras – Meta

Se identifica un núcleo de detección temprana de deforestación en el límite entre los municipios de Vistahermosa y Puerto Lleras (Meta), caracterizado por un área deforestada continua y de gran tamaño, localizada en cercanías del sector norte del PNN Sierra de La Macarena. Esta transformación se vincula con el acaparamiento de tierras y la conversión del bosque a pastizales. La dinámica de deforestación se concentra asociados a los caños de la zona norte del río Güéjar; en particular, las detecciones tempranas se registran sobre las márgenes de los caños Danta Name y Rayado. En el ámbito veredal, el núcleo abarca las veredas Alto Las Delicias, Buenos Aires y El Darién-Cunimía. (Vistahermosa).


Causas de deforestación identificadas: Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva; Praderización acaparamiento de tierras; Infraestructura de transporte no planificada


Otras áreas de interés: Noroccidente del Putumayo


Hacia el noroccidente del departamento del Putumayo se registra una alta incidencia de deforestación, distribuida de manera dispersa en varios municipios: Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel. Las detecciones tempranas se asocian a los corredores de los principales ríos del departamento: Río Putumayo, Río Caquetá, Río Guineo, Río Mandur y Río Guamuez. Esta dinámica guarda relación con los núcleos de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán reportados en el tercer trimestre de 2025 y con el núcleo Villa Catalina – Puerto Guzmán del primer trimestre de 2026, lo que evidencia una presión persistente sobre los bosques del departamento.

Análisis en cifras













Municipios con mayores detecciones tempranas de deforestación

Para el **III trimestre de 2026** se identifica que los municipios con mayor concentración de Detecciones Tempranas de Deforestación están localizados en el Bioma de la Amazonía destacándose **San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.**

Reporte regional

Deforestación estimada en (ha) Amazonía colombiana - III trimestre 2026

5.409 hectáreas deforestadas en los departamentos de la Amazonía colombiana en el III trimestre 2026.

2.621 hectáreas menos que en el mismo periodo de 2025.

Reducción de la deforestación estimada

Aumento de la deforestación estimada


Putumayo	Caquetá
- 1.333 ha	- 752 ha
Guaviare	**Meta**
- 462 ha	- 221 ha
Vaupés	
+ 183 ha	

La pérdida de cobertura boscosa en este sector responde a un evento natural de chagras de viento.




Guacamaya bandera
Ara macao

La deforestación estimada para el III trimestre de 2026 se concentró en los departamentos de:



Dinámica de los tamaños de parches en la región Amazonía III trimestre 2026



Para este periodo se reportaron 1.335 parches deforestados superiores a 1 hectárea en la Amazonía, de los cuales el 75% corresponde a parches con áreas inferiores a 5 hectáreas, y el 15 %, a parches con áreas entre 5 y 10 hectáreas. Para este trimestre se identificaron 10 parches con áreas superiores a 30 hectáreas, que se concentran principalmente en el departamento de Meta con 4 parches (40 %), Caquetá con 3 parches (30 %) y Guaviare con 2 parches (20 %).

Asimismo, se destaca que para este trimestre del año 2026 se identifica que el mayor parche de pérdida de bosque de origen antrópico corresponde a un polígono de 74 hectáreas, asociado a factores de praderización en la Zona de Baldíos de la Nación en la vereda Alto Siare en el municipio de Mapiripán (Meta).


Relación de polígonos identificados

- **996** polígonos inferiores a **5** ha
- **202** polígonos entre **5** y **10** ha
- **127** polígonos entre **10** y **30** ha
- **6** polígonos entre **30** y **50** ha
- **4** polígonos superiores a **50** ha

Período	Autoridad ambiental regional	Departamento	Rango estimado deforestación (hectáreas)	% Calidad general *
Julio	Cormacarena	Meta	332 - 367	95 %
	CDA	Guaviare	293 - 312	98 %
	Corpomazonia	Caquetá	436 - 491	98 %
		Putumayo	88 - 97	97 %
Agosto	Cormacarena	Meta	512 - 589	96 %
	CDA	Guaviare	521 - 542	96 %
	Corpoamazonia	Caquetá	725 - 802	97 %
		Putumayo	90 - 97	96 %
Septiembre	Cormacarena	Meta	673 - 749	95 %
	CDA	Guaviare	251 - 266	97 %
	Corpoamazonia	Caquetá	571 - 618	96 %
		Putumayo	329 - 364	96 %
Julio - septiembre	Corpoamazonia	Amazonas	60 - 69	96 %
	CDA	Guainía	9 - 11	94 %
		Vaupés	262 - 277	96 %

*Este es el porcentaje de exactitud y confiabilidad en la información del mapa por departamento y mes.

Especie del trimestre



Jupunba laeta

Estado: en Peligro Crítico (CR)
Resolución 0126 del 2024 Minambiente

Localización: Inírida (Guainía) y El Encanto (Amazonas)

Hojas


Flor


Fruto

Fuente:
"Estructura y biodiversidad de los bosques de la Amazonia colombiana"
Análisis del primer ciclo de implementación del Inventario Forestal Nacional

¿Sabías que...?

- Desde 2013, el SMByC genera cifras anuales que permiten conocer dónde se concentra la deforestación y analizar sus tendencias en departamentos, municipios, regiones naturales y jurisdicciones de las corporaciones autónomas regionales.
- El SMByC produce información para estimar las reservas de carbono almacenadas en diferentes componentes de los bosques naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la deforestación y degradación forestal.



Este es YAC, el caimán negro, integrante de la Liga de reporteros de monitoreo FAO - IDEAM

Cápsula de monitoreo comunitario

Al igual que en países como Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y México, Colombia cuenta con experiencias de monitoreo comunitario de los bosques, en las que comunidades indígenas y organizaciones locales participan en la vigilancia de sus territorios y la conservación de sus ecosistemas. Estas iniciativas demuestran el valor del conocimiento local para proteger los bosques. En Colombia, el Monitoreo Comunitario Participativo (MCP), articulado con el IDEAM, fortalece esta labor al vincular a las comunidades en la generación de información sobre sus territorios y complementar el monitoreo nacional con el conocimiento de quienes habitan y cuidan los bosques.

