BOLETÍN DTD 46

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)
Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)

Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD)
I trimestre (Enero -marzo) 2026

Introducción

El Ideam través del **Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC)** como parte de su componente de alertas tempranas publica los **Boletines Trimestrales de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD)** que identifican los Núcleos de Detección Temprana y los reportes mensuales de deforestación estimada para los siete departamentos de la Amazonia colombiana. Estos datos permiten realizar un seguimiento a la implementación del Plan Integral de Contención de la Deforestación, e identificar potenciales acciones territoriales para la conservación del Bosque.

El SMByC viene implementando un proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas con las autoridades ambientales regionales para la generación de los Boletines DTD desde los territorios, actividades que se implementan gracias a recursos financieros de cooperación internacional provenientes del **Proyecto REDD+ de GCF-Visión Amazonia, el Programa REM Colombia-Visión Amazonia (fase II), la iniciativa GEF-Corazón de la Amazonia**, y el proyecto "Bosques para la vida" con cargo a recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

Guacamaya roja (*Ara macao*)

El primer boletín trimestral del año 2026 corresponde al pico y cierre de la temporada seca en las principales áreas forestales del país, donde se identifican **dieciocho (18) núcleos de detecciones tempranas de deforestación, localizados principalmente en el bioma de la Amazonía colombiana.** Así mismo, el análisis indica que la mayor detección de núcleos de alertas tempranas por deforestación está asociada a los departamentos de **Guaviare y Meta**.

Este reporte fue generado por un equipo técnico con roles de intérpretes, coordinación y control de calidad, integrado por 14 hombres y 7 mujeres.

67 % Hombres

33 % Mujeres

Mono aullador (*Alouatta seniculus*)

Bosque estable
Deforestación
No bosque
Núcleos de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD)

Con el apoyo técnico de:
Corpoamazonia · CDA · Corpoamazonia

Financiado por:
REM Visión Amazonia · Corpoamazonia · Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura · Green Climate Fund · Fondo Para la Vida y la Biodiversidad

Análisis de los núcleos Detecciones Tempranas de Deforestación - I trimestre 2026

La descripción de causas y agentes para los núcleos de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD), corresponde a un ejercicio de caracterización técnica desarrollado conforme a los lineamientos conceptuales y metodológicos del SMByC del IDEAM. Para su construcción, se toma como base la localización de las detecciones tempranas y la identificación de los núcleos donde estas se concentran en cada trimestre, información que se complementa con formularios remitidos a autoridades ambientales regionales, bases de datos del SMByC, análisis de imágenes satelitales, análisis espaciales y otras fuentes secundarias disponibles; posteriormente, estos insumos son integrados y triangulados para generar la caracterización general y el listado de principales causas directas identificadas en cada núcleo.

Impacto directo de la deforestación: Alto — Medio — Bajo

Consulta los lineamientos para la caracterización de causas y agentes de la deforestación: https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/presnsa/publicaciones/lineamientos_para_la_caracterizacion_de_causas_y_agentes_de_la_deforestacion_en_colombia.pdf

N 1 Cuemaní - San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá - Caquetá.

Las zonas más afectadas se concentran sobre las márgenes sur y suroriental del río Yari, y en inmediaciones del río Caemaní, incluyendo algunos sectores del PNN Serranía de Chiribiquete. Las veredas más afectadas son Nueva Colombia, Cerritos, Ilusiones del Yari, Las Dioses, Diamante de la Rilla, Caño Azul y la Zona de Reserva Forestal declarada por la Ley 2 /1959.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 2 Yaguará II – Meta, Guaviare.

Aumenta la concentración de detecciones tempranas en límites de los departamentos de Meta y Guaviare, municipios de La Macarena, San José del Guaviare y Calamar.

Pérdida de bosque al sur del río Guayabero, inmediaciones del Caño San Antonio y al norte del río La Tunia, afectando el sector norte del Resguardo Yaguara II y del PNN Serranía de Chiribiquete. Las veredas más afectadas son: Chuapal, El Capricho, San Miguel, Sardinata, Villa y Bocas del Río Guayabero, La Cristalina, La Reforma, Los Pozos, Raudal y San Juan de Losada.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 3 Parque Nacional Natural Tinigua - La Macarena, Meta.

Núcleo en el municipio de La Macarena, Meta, afectando el sector sur del PNN Tinigua entre el trilagudo conformado por el río Guayabero y los centros poblados de San Juan de Lozada y Bocas del Perdido. Esta presión afecta la margen sur del río Guayabero con conversión del bosque a amplias extensiones de pastos.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Predeterminación acaparamiento de tierras + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 4 La Uribe, Meta.

Pérdida de bosque 2010 del cuarto trimestre de 2025, en el municipio de Uribe, Meta, que afecta los bosques del corredor entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua, Cordillera de Los Picachos y Sierra de La Macarena.

También, se identifican detecciones de pérdida en el Resguardo Indígena La Julia y las veredas La Primavera, Tierradentro 2, La Siria, Manolas, El Placer y La Julia.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Predeterminación acaparamiento de tierras + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 5 Kuway Nueva York - El Retorno/Miraflores, Guaviare.

Núcleo en la zona de Kuway-Nueva York, localizado al occidente de la Reserva Nacional Natural Nukak, en la vereda Nueva Primavera. Desde el componente hidrográfico, la deforestación se concentra en los sectores de Caño Grande y Caño Camello, con incidencia en las veredas Agua Bonita (media y baja) en el municipio de El Retorno, y la vereda La Unión en el municipio de Miraflores.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada − · Cultivos de uso ilícito −

N 6 Calamar – Agua Bonita, Guaviare.

Núcleo DTD con alta dinámica asociada a procesos de expansión de la frontera agropecuaria, que avanzan en dirección nororiental hacia el PNN Serranía de Chiribiquete.

Desde el punto de vista espacial, el núcleo afecta la Zona de Reserva Forestal protectora por la Ley 2/1959, no obstante la mayor concentración de detecciones tempranas de deforestación se registra en las veredas Caño Gravilla, Puerto Palma, La Cristalina y El Triunfo.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 7 Meta – Puerto Rico.

Este núcleo se localiza en el municipio de Puerto Rico (Meta), y algunas detecciones adicionales en el municipio de Vista Hermosa.

La dinámica de pérdida de cobertura boscosa afecta el sector nororiental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y sus zonas de amortiguación. Los eventos de deforestación se concentran en las microcuencas del río Caño Cafre y el caño La Cabra. A nivel local, la afectación se focaliza en la vereda La Cañada del municipio de Puerto Rico.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Predeterminación acaparamiento de tierras + · Cultivos de uso ilícito − · Infraestructura de transporte no planificada −

N 8 Mapiripán, Meta.

La pérdida de bosque natural se localiza en la zona nororiental de Mapiripán, Meta, delimitado por los ríos Iteviare y Siare.

La deforestación estimada se concentra con especial intensidad en las veredas Alto Siare y Linibrisas del Iteviare, así como en las inmediaciones de los caños El Mangón y Las Vejitas. Otros sectores de afectación se identifican en las veredas Brisas, Rincón del Indio y El Caribe, lo que refleja un patrón espacial de afectación disperso.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada − · Expansión agrícola en pequeña escala −

N 9 Solano, Caquetá.

Núcleo en los municipios de Solano y Cartagena del Chairá en Caquetá. La pérdida de cobertura boscosa se concentra al norte del Resguardo Indígena Coreguaje de Jericó-Consaya, con afectaciones sobre las márgenes del río Sunsiyaes.

Solano registra las mayores afectaciones en las veredas Caño Verde, Sábalo y Nueva Libertad; mientras en Cartagena del Chairá impactan las veredas La Ceiba, Sunsiya Medio, Villa Nueva y Peñas Blancas.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada − · Extracción ilícita de minerales (oro aluvial) −

N 10 El Camuya, Caquetá.

Las detecciones tempranas se localizan en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), en las inmediaciones del sector noroccidental del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, en afectando la microcuenca del río El Camuya.

La deforestación se concentra en la vereda Altagracia, con incidencias en las veredas El Cambrín, Aguas Claras y Nueva Esperanza. Parches de deforestación de carácter disperso al interior del Parque Nacional Natural.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 11 Medio San Juan – Condoto – Chocó.

Este núcleo se localiza en los municipios de Medio San Juan (Andagoya), Condoto y Novita, en el departamento del Chocó.

La deforestación en esta zona se origina por una alta actividad de minería de oro de aluvión, concentrándose la pérdida de cobertura boscosa en las márgenes de los ríos Brazuelo y Agua-susia. Se registran afectaciones en las inmediaciones del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Cocomocosin en el municipio de Condoto.

Extracción de minerales de oro aluvial + · Cultivos de uso ilícito −

N 12 Villa Catalina - Puerto Guzmán, Putumayo.

Núcleo de deforestación en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo, asociado al interfluvio de los ríos Sabilla y Yurilla, extendiéndose hacia la quebrada Las Damas.

Pérdida de cobertura boscosa en la zona central del núcleo, en concordancia con los patrones de trimestres previos del año 2025. A nivel territorial, alertas tempranas en la vereda Yurilla, el área forestal homónima, afecta el sector nororiental del Resguardo Indígena Villa Catalina de Puerto Rosario.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada − · Cultivos de uso ilícito −

N 13 Río Sunsiyas-Caño Sucio, Cartagena del Chaira, Caquetá.

Núcleo de detección temprana en Cartagena del Chairá, Caquetá, conectado hacia el suroriente con el núcleo de Cuemaní.

Las detecciones se concentran sobre el margen sur del río Sunsiyas y el río Caguán, incluyendo su interfluvio. A nivel territorial, afectación en las veredas Naranjalas y Caño Sucio. El núcleo se posiciona al norte del Resguardo Indígena Huitoto - Paraje de Witora, evidenciando presiones sobre territorios étnicos y áreas estratégicas para la conectividad ecológica regional.

Predeterminación acaparamiento de tierras + · Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 14 Acandí – Chocó.

Este núcleo de deforestación se localiza en el municipio de Acandí, Chocó, en una zona de alta importancia ecológica.

La dinámica de pérdida de cobertura boscosa se encuentra asociada principalmente a las márgenes del río Tolo, impactando la Reserva Forestal Protectora Nacional del Darién y del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Pineda y Loma de Caleta. Se registran alertas tempranas sobre el Resguardo Indígena Embera Katío de Pescadito.

Factores biofísicos + · Extracción ilícita de minerales −

N 15 Nueva Ilusión - Cartagena del Chairá – Caquetá.

Este núcleo DTD se identifica hacia el suroccidente del núcleo de Cuemaní, incrementando la velocidad de la dinámica de pérdida de cobertura boscosa en la región.

En términos geográficos, el área de afectación se encuentra delimitada al oriente por el río Caguán y al sur por el río Sunsiyas. La mayor concentración de deforestación se presenta con gran intensidad en las veredas Nueva Ilusión y Laguna Verde.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Predeterminación acaparamiento de tierras + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 16 Mecaya - Leguizamo, Putumayo.

Se identifica un núcleo persistente de deforestación en Puerto Leguizamo, Putumayo, donde esta dinámica de pérdida de bosque afecta las inmediaciones del sector norte del Parque Nacional Natural La Playa.

Esta deforestación se asocia a los bosques del río Sencella. La mayor intensidad de afectación se concentra en las veredas Puerto Príncipe, Punto Rojo y Casa Roja.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Predeterminación acaparamiento de tierras + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 17 Río Caguán - Palermito – Caquetá.

El núcleo de deforestación se localiza en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, con una consolidación hacia el sector centro-occidental del municipio.

La pérdida de cobertura boscosa evidencia detecciones tempranas en el margen oriental del río Caguán, asociadas principalmente a la quebrada Palermito. Estas alertas reflejan procesos activos de transformación del bosque que impactan las veredas Los Linos y Palermito.

Prácticas no sostenibles de ganadería extensiva + · Predeterminación acaparamiento de tierras + · Infraestructura de transporte no planificada −

N 18 Montecristo – Bolívar.

Núcleo de detección temprana relacionado con eventos extremos hidrometeorológicos.

El incremento en los niveles de precipitación generó procesos de remoción en masa (deslizamientos), que derivaron en la degradación y pérdida de cobertura forestal en la parte alta de la Quebrada Montecristo y sus tributarios, las Quebradas Santa Clara, La Reserva y San Mateo, lo que comprometió la integridad ecológica de la Serranía de San Lucas.

Factores biofísicos + · Cultivos de uso ilícito −

Análisis en cifras Detecciones Tempranas de Deforestación nivel nacional - I trimestre 2026

Municipios con mayores detecciones tempranas de deforestación

El análisis del I trimestre de 2026 detectó **25 municipios con mayor deforestación** en todo el territorio nacional, predominando los localizados en la **región Amazonía**.

Reporte regional deforestación estimada en (ha) Amazonía colombiana - I trimestre 2026

37.660 hectáreas deforestadas en los departamentos de la Amazonía colombiana en el I trimestre 2026.

10.608 hectáreas más que en el mismo periodo de 2025.

Meses con mayor y menor deforestación estimada para el I trimestre de 2026

Febrero deforestación estimada → 21.064 ha

Marzo deforestación estimada → 2.415 ha

Aproximadamente **99 %** de la deforestación estimada para el I trimestre de 2026 se concentra en 4 departamentos:

Caquetá **30 %** · Guaviare **30 %** · Meta **32 %** · Putumayo **6 %**

Jaguar (*Panthera onca*)

Deforestación estimada departamentos región Amazonía I trimestre 2026

Para este período se reportaron 8.450 parches deforestados superiores a 1 hectárea en la Amazonía, de los cuales el 72% corresponde a parches con áreas inferiores a 5 hectáreas, y el 17 %, a parches con áreas entre 5 y 10 hectáreas. Para este trimestre se identificaron 215 parches con áreas superiores a 20 hectáreas, que se concentran principalmente en el departamento de Guaviare con 81 parches (38 %), Caquetá con 63 parches (29 %) y Meta con 62 parches (29 %). Así mismo, se destaca que para este primer trimestre del año 2026 se identifica que el mayor parche de pérdida de bosque de origen antrópico, corresponde a un polígono de 90,7 hectáreas asociado a factores de predeterminación en la Zona de Baldíos de la Nación en la vereda El Silencio en el municipio de Mapiripán, Meta.

En términos de priorización de acciones, se identifican 70 parches de deforestación con áreas iguales o superiores a 30 hectáreas, donde se destaca la presencia de nueve (9) parches con áreas superiores a 50 hectáreas, distribuidos en los departamentos de Meta (4 parches), Guaviare (3 parches) y Caquetá (2 parches).

Relación de polígonos identificados y hectáreas

6.125 polígonos entre 1 y 5 ha
1.439 polígonos entre 5 y 10 ha
671 polígonos entre 10 y 20 ha
184 polígonos entre 20 y 40 ha
31 polígonos superiores a 40 ha

Bosque estable
Deforestación
No bosque

Período	Autoridad ambiental regional	Departamento	Rango estimado deforestación (hectáreas)	% Calidad general *
Enero	Cormacarena	Meta	4.784 -5.134	97 %
	CDA	Guaviare	3.003 - 3.126	98 %
	Corpomazonia	Caquetá	4.466 - 4.839	96 %
		Putumayo	1.054 - 1.165	96 %
Febrero	Cormacarena	Meta	6.049 - 6.424	95%
	CDA	Guaviare	7.030 - 7.465	98 %
	Corpoamazonia	Caquetá	6.139 - 6.650	97 %
		Putumayo	1.148 - 1.219	96 %
Marzo	Cormacarena	Meta	1.006 - 1.069	97 %
	CDA	Guaviare	892 - 929	98 %
	Corpoamazonia	Caquetá	303 - 322	98 %
		Putumayo	146 - 159	95 %
Enero - Marzo	Corpoamazonia	Amazonas	106 - 123	93 %
	CDA	Guainía	147 - 172	94 %
		Vaupés	122 - 141	95 %

*Este es el porcentaje de exactitud y confiabilidad en la información del mapa por departamento y mes.

Especie del trimestre

Caimo

(*Chrysophyllum januariense*)

Redescubierto recientemente en el departamento de Guainía, *Chrysophyllum januariense* es un árbol de la familia Sapotaceae que se consideraba extinto a nivel mundial desde 1998.

Su hallazgo fue confirmado por el Inventario Forestal Nacional liderado por el Ideam, revelando que la especie sobrevive en los bosques de la Amazonía colombiana.

Fuente: Inventario Forestal Nacional (IFN) 2023.

¿Sabías que...?

- EL SMByC fortaleció su capacidad de procesamiento de imágenes de satélite y datos geoespaciales a través de la renovación del centro de datos del Ideam que se expresa en la adquisición de un nuevo servidor que permite procesar datos de forma más eficiente y con mayor cobertura.
- A través de recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad el Ideam reactivó el servicio de adquisición de imágenes de satélite de alta resolución para el monitoreo del Bosque en Colombia.

Este es YAC, el caimán negro, integrante de la Liga de reporteros de monitoreo FAO - IDEAM

Cápsula de monitoreo comunitario

El Monitoreo Comunitario Participativo continúa creciendo como una apuesta colectiva por la protección de los bosques y la construcción de conocimiento desde los territorios. Estos son algunos de sus logros y avances en cifras durante los últimos 10 años:

- **60** organizaciones participantes
- **15** espacios de formación
- **5** intercambios de saberes
- **2** encuentros de la Red Nacional de Monitoreo Comunitario Participativo